



OSTEPARON COMPOUND

Contrastare l'ostecondrosi

Apporta in elevatissima concentrazione e in rapporto equilibrato le vitamine, i microelementi minerali e gli aminoacidi essenziali per garantire l'ottimale sviluppo e l'integrità dei tessuti osteo-cartilaginei e muscolari del puledro. Somministrato alle fattrici gravide assicura la corretta mineralizzazione dello scheletro del feto e la formazione di cartilagini di accrescimento integre.

Migliora le performances di accrescimento ed assicura il corretto sviluppo muscolo scheletrico.

Nei puledri svezzati favorisce la formazione di cartilagini articolari integre.

COMPOSIZIONE

ANALISI CHIMICA

Proteina grezza	48 %
Fibra grezza	0,2 %
Oli e grassi grezzi	0,1 %
Ceneri grezze	6,5 %
Sodio	0,28 %

ADDITIVI PER KG

Vitamine

(E672) Vitamina A	3.300.000 UI
(E671) Vitamina D3	125.000 UI
Vitamina B1 (tiamina mononitrato)	2.300 mg
Vitamina B2 (riboflavina)	1.100 mg
(3a831) Vitamina B6 (piridossina cloridrato)	1.700 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)	6,5 mg
(E300) Vitamina C (Acido L-Ascorbico)	11.800 mg
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferil acetato)	13.300 mg
(3a316) Acido folico	500 mg
Biotina	14 mg
(3a841) Calcio-D-pantotenato	1.000 mg
Vitamina K	4.000 mg
(3a315) Niacinamide	2.800 mg

Composti di oligoelementi

(E1) Carbonato ferroso	6.400 mg
(E1) Chelato di ferro di aminoacidi idrato	1.300 mg
(3b304) Carbonato di cobalto in granuli rivestiti	400 mg
(E4) Solfato rameico pentaidrato	10.800 mg
(E4) Chelato rameico di aminoacidi	3.000 mg
(3b8.10) Forma organica del selenio da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060	10.000 mg
(E5) Solfato manganoso monoidrato	14.000 mg
(E5) Chelato di manganese di aminoacidi idrato	3.300 mg
(E6) Solfato di zinco monoidrato	20.500 mg
(E6) Chelato di zinco di aminoacidi idrato	8.000 mg

Aminoacidi

(3c301) DL-metionina	12.000 mg
(3.2.3.) L-lisina monocloridrato	320.000 mg
(3.3.1.) L-treonina	210.000 mg

PROPRIETÀ

Apporta un'elevata concentrazione di vitamine e minerali. È appositamente studiato per assicurare l'ottimale sviluppo dei tessuti osteo-cartilaginei del puledro. Elimina le carenze vitaminico-minerali responsabili dell'insorgenza dell'ostecondrosi e dell'evoluzione dei suoi quadri verso forme irreversibili.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Puledri (Foals): 50/60 g al giorno (1-1,5 misurini)

Puledri (Yearlings): 80 g al giorno (2 misurini)

Fattrici dall'ottavo mese di gravidanza al parto:
80 g per al giorno (2 misurini)

Fattrici in lattazione: 100 g al giorno (2,5 misurini)

CONFEZIONE

Secchiello da 5 a 10 Kg di granulato

ASSOCIAZIONE CONSIGLIATA

Calcibolin